



Bundesinstitut für
Öffentliche Gesundheit

RSV profilaksisi

Yeni doğanların ve küçük çocukların RSV kaynaklı
ağır solunum yolları hastalıklarından korunması



infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.

Özetle: RSV profilaksisi nedir?

RSV profilaksisi bir aşı gibi uygulanır ve uyluğa enjekte edilir. **RS virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalıklarının ağır seyrinden koruması amaçlanmaktadır.** Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) Haziran 2024'ten bu yana tüm yeni doğanlara ve ilk RSV sezonunda olan bebeklere Nirsemivab (Ticari adı: Beyfortus) etken maddeli RSV profilaksisi öneriyor.

RSV nedir ve hangi hastalık belirtileri ortaya çıkar?

RSV, Respiratuar Sinsityal Virüs'ün kısaltmasıdır. RS virüsü solunum yollarını tutar.

Hafif seyirlerde hastalık belirtileri soğuk algınlığı gibi ortaya çıkar. Fakat özellikle küçük çocuklarda alt solunum yolları enfeksiyonuyla ("bronşit") veya zatürre ile ağır seyirler meydana gelebilir. Ayrıca bir RVS enfeksiyonu orta kulak iltihabının da en yaygın nedenidir.

Hastalığın ağır seyri sıklıkla hastanede tedavi edilmelidir. Daha nadir durumlarda bir RSV enfeksiyonu ölüme yol açabilir. RSV hastalığının ağır seyrettiği durumların yüzde 80'i daha önce sağlıklı olan küçük çocuklarda meydana gelir.



RSV, özellikle **öksürük, hapşıрма ve konuşma** sırasında saçılan damlacıklarla aktarılır.



Ayrıca virüs **temas** yoluyla da aktarılabilir.

Neden RSV profilaksisi öneriliyor?

Daha az ağır seyirler

RSV profilaksisi hastalığın ağır seyretme riskini azaltır. Bu nedenle bir RSV profilaksisi sonrasında hasta küçük çocukların daha nadir hastanede tedavi edilmesi gerekir.

8 aylıktan küçük 1.000 bebek arasından su kadarının bir RSV hastalığı nedeniyle hastanede tedavi edilmesi gerekir.



Profilaksisiz: 35



Profilaksili: 7

Tıbbi bakımda daha az darboğazlar

Sonbahar ve kış ayların RS virüsleri çok yoğun şekilde yayılır. Bu, sonbahar ve kış aylarında tıbbi bakımda darboğazlar oluşmasına yol açar. Bu durumdan hem çocuk muayenahaneleri hem de hastaneler etkilenir.

Ağır hastalık seyirlerinin azalması, çocuk muayenahaneleri ve hastaneler üzerindeki yükü hafifletebilir. Bu tür bir **rahatlatma tüm çocukların tıbbi bakımını iyileştirir.**



Almanya'da RSV, küçük çocukların hastanede tedavi edilmesinin en sık nedenidir. Tüm küçük çocukların en fazla %70'i hayatlarının ilk yılında RS virüsüyle enfekte olur. Neredeyse tüm çocuklar hayatlarının ilk iki yılı içinde RSV ile enfekte olur.

Kimler RSV profilaksisi almalı?

RSV profilaksisi, hayatlarındaki ilk RSV sezonunda olan tüm yeni doğanlara ve küçük çocuklara tavsiye edilir. Bir çocuk ne kadar küçükse hastalığın ağır seyretme riski o kadar yüksektir. Yeni doğanlar ve 6 aydan küçük çocuklarda RSV enfeksiyonunun ardından hastalığın ağır seyretme riski özellikle yüksektir.

Küçük bir çocuk geçmişte halihazırda bir RSV enfeksiyonu geçirmişse genellikle RSV profilaksisi gerekli değildir.

RSV profilaksisi ne zaman uygulanmalı?

RS virüsleri özellikle Ekim ila Mart aylarında yayılır. Bu nedenle RSV profilaksisinin zamanlaması çocuğun ne zaman doğduğuna bağlıdır:

- ▶ Nisan ile Eylül ayları arasında doğan küçük çocuklarda RSV profilaksisi **Eylül ile Kasım arasında (yani çocuğun ilk RSV sezonu başlamadan hemen önce)** uygulanmalıdır.
- ▶ Ekim ile Mart ayları arasında doğan küçük çocuklarda RSV profilaksisi **doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede** yapılmalıdır. Profilaksi, ideal olarak doğumhaneden çıkarken veya U2 muayenesinde (3-10 günlükken) yapılır. Kaçırılan bir dozun RSV sezonu içinde mümkün olduğunca erken telafı edilmesi gerekir.



Profilaksi **Eylül ile Ekim** arası



Profilaksi **doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede**

RSV profilaksisi nasıl etki eder ve koruma ne kadar sürer?

RSV profilaksisi bir nevi pasif bağışıklamadır. Uygulama sırasında virüse karşı savunma maddeleri (antikorlar) uyluğa enjekte edilir. Bu savunma maddeleri virüslerin insan hücrelerini istila etmesini ve vücutta yayılmasını zorlaştırır. Savunma maddeleri doğrudan verildiği için RSV profilaksisi uygulamadan hemen sonra korumaya başlar. Pasif bağışıklamanın vücudun antikorları önce kendisinin üretmesi gereken klasik aşılardan farkı da burada ortaya çıkmaktadır.

RSV profilaksisinin koruması genelde tüm RSV sezonu boyunca sürer. Bu nedenle bir çocuğu hayatının ilk yılı boyunca en iyi şekilde korumak için tek seferlik bir doz yeterlidir.

RSV profilaksisi güvenli mi?

RSV profilaksisi iyi tolere edilir. Çeşitli çalışmalar bunu gösteriyor. Uygulamadan sonra aşı yerinde ağrı veya geçici döküntü gibi reaksiyonlar meydana gelebilir. Daha nadiren etken maddeye alerjik reaksiyonlar da oluşabilir. Tolere edilebilirlik ve güvenlik sürekli araştırılıyor.



RSV ve çocuğunuzu ve kendinizi nasıl koruyabileceğinize ilişkin ayrıntılı bilgileri www.infektionsschutz.de veya www.rki.de/rsv adreslerinde bulabilirsiniz.

Künye

Yayımcı: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 50819 Köln. Tüm hakları saklıdır. Robert Koch Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanmıştır.

Redaksiyon: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG)

Tasarım: VALID Digitalagentur GmbH

Resimler: Adobe Stock, S.Kobold, morrowlight – stock. adobe.com

Ürün no: D81000471

Güncelleme: Kasım 2025

Sipariş adresi: Bu broşürü www.infektionsschutz.de internet adresinden indirebilirsiniz. Alıcı veya üçüncü kişiler tarafından satılması için öngörülmemiştir.

Broşür yedi dilde indirilebilir.



infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.



Bundesinstitut für
Öffentliche Gesundheit